

DIFFERENTS SYNDROMES

IST

DEFINITION

Un syndrome est un ensemble des symptômes et signes qui constituent une entité pathologique dont les étiologies sont bien définies

Mots clés : ensemble, symptômes, signes, entité , étiologie bien définie.

Écoulement vaginal

- **Définition** :
sécrétion vaginale anormale par la couleur, odeur, l'aspect et/ou abondance
- **Symptômes** :
 - pertes vaginales
 - prurit génital
 - dysurie
 - dyspareunie

Écoulement vaginal (suite)

- **Signes cliniques :**

- écoulement vaginal / cervical anormal
- inflammation vaginale / cervicale
- hémorragie de contact (col saignant au contact)

- **Etiologie :**

- * Vaginale (vaginite)

- Trichomonas vaginalis
- Candida albicans
- Gardenerella vaginalis
- autres germes vaginaux anaérobies (vaginose bactérienne)

- * Cervicale (cervicite)

- Neisseria gonorrhoeae
- Chlamydia trachomatis

Écoulement vaginal (suite)

N.B.

- L'origine cervicale ne peut être visible qu'avec le spéculum
- L'aspect des leucorrhées ne peut déterminer l'étiologie
- L'évaluation du risque de la patiente est très utile pour le diagnostic



Écoulement vaginal (suite)

Facteur de Risque (FR)

- Calcul du FR : se fait avec 4 éléments suivants :
 - Age \leq 21 ans
 - Etat civil = célibataire
 - Nbre de partenaires sexuel $>$ 1 dans les 12 derniers mois
 - Nouveau partenaire sexuel au cours des 3 derniers mois.
 - Avoir un partenaire qui a une IST

Autres : notion de dyspareunie, saignements après rapports sexuels ou entre les règles; présence de muco-pus cervical, d'érosions cervicales

- Interprétation :
 - FR positif : si au moins 3 éléments positifs
 - En cas de FR positif traiter comme cervicite + vaginite
 - N.B. Tenir compte du comportement sexuel et de l'examen clinique

REMARQUES sur la Cervicite et Facteur de Risque (FR)

- Cervicite: signes cliniques:
 - muco-pus cervical
 - érosion cervicale
 - friabilité du col
 - saignement du col entre les règles
et au cours des rapports sexuels.

Douleur abdominale basse

- **Définition :**

sensibilité utérine à la mobilisation du col et/ou des annexes avec ou sans écoulement avec plaintes de douleurs du bas ventre

- **Symptômes :**

- douleur abdominale basse spontanée
- dyspareunie (pas toujours)
- pertes vaginales, ménometrorragies, dysurie, parfois nausées et vomissement, parfois fièvre

Douleur abdominale basse

- **Signes cliniques :**

- Sensibilité à la mobilisation du col
douleur annexielle a la palpation

- parfois écoulement cervical
 - fièvre (cas aigu)

- N.B. Toujours exclure les urgences médicochirurgicales comme avortement, appendicite, GEU, ...

- **Etiologie :**

- Neisseria gonorrhoeae
 - Chlamydia trachomatis
 - Germes anaérobies (Mycoplasma hominis) et gram-négatifs

Ulcération Génitale (UG)

- **Définition :**
toute perte de substance tégumentaire (cutanée ou muqueuse) des organes génitaux
- **Symptômes :**
 - une ou plusieurs plaies aux organes génitaux
 - parfois sensation de brûlure à la miction (ulcère situé à la vulve)

Ulcération Génitale (UG) suite

- **Signes cliniques :**
 - présence de la plaie ou d'une cicatrice
 - souvent association d'adénopathies inguinales sensibles
- **Etiologie :**
 - Haemophilus ducreyi (Chancre mou)
 - Treponema pallidum (sypilis)
 - Virus de l'herpès simplex **type II (herpès)**
 - klebsiella granulomatis (donovanose) U2
 - Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 (lymphogranulomatose vénérienne = LGV)
 - Sarcoptes scabiei hominis (gâle)

Diapositive 11

U2

les donnees recentes montrent que les ulcerations genitales sont le resultat d'une infection par le HSV2.

UNC; 18/08/2005

Bubon Inguinal (BI)

- **Définition :**
hypertrophie des ganglions lymphatiques de l'aire inguinale
- **Symptômes :**
 - douleur et/ou tuméfaction au niveau de l'aîne
- **Signes cliniques :**
 - douleur et/ou fluctuation de la tuméfaction
 - unilatérale ou bilatérale

Bubon Inguinal (BI) suite

- **Etiologie** : (comme UG)
 - Haemophilus ducreyi (Chancre mou)
 - Treponema pallidum (syphilis)
 - Virus de l'herpès simplex type II (herpès)
 - klebsiella granulomatis (donovanose)
 - Chlamydia trachomatis L1, L2,L3 (lymphogranulomatose vénérienne = LGV)

Condylomes

- **Définition :**
plaques muqueuses papuleuses ou excroissances sous forme de crêtes de coq au niveau de la sphère ano-génitale
- **Symptômes et signes cliniques :**
 - présence d'excroissances ano-génitales souvent prurigineuses
- **Etiologie :**
 - Human papilloma virus (Virus du papillome humain)

Écoulement Urétral (EU)

- **Définition :**
présence d'un exsudat dans l'urètre antérieur. S'accompagnant souvent de douleur mictionnelle ou de gêne au niveau de l'urètre
- **Symptômes :**
 - écoulement du pus par le méat urétral
 - dysurie (brûlures en urinant)

Écoulement Urétral (EU) suite

- **Signes cliniques :**

- présence d'écoulement urétral (abondant ou non, purulent ou mucoïde, ...)

- **Etiologie :**

On distingue deux grands groupes :

- uréthrite gonococcique : *Neisseria gonorrhoeae*

- uréthrites non gonococciques :

- *Chlamydia trachomatis*
- *Ureaplasma urealyticum*
- *Trichomonas vaginalis*

Tuméfaction du Scrotum (TS)

- **Définition :**

inflammation de l'épididyme qui s'accompagne de douleurs, œdème et d'érythème et parfois d'écoulement urétral et de dysurie. Avec inflammation du testicule adjacent (orchi-épididymite)

- **Symptômes :**

gonflement douloureux du scrotum
(début brusque, unilatéral, antécédents d'EU)

Tuméfaction du Scrotum (TS) suite

- **Signes cliniques** :
 - atteinte unilatérale
 - scrotum rouge et/ou oedématié, sensible à la palpation
- **Etiologie** : (Cfr EU)
 - Neisseria gonorrhoeae
 - Chlamydia trachomatis
 - Ureaplasma urealyticum
 - Virus ourlien

Conjonctivite du Nouveau-Né (CNN)

- **Définition :**
une conjonctivite purulente aiguë survenant au cours du premier mois de la vie, contractée à la naissance.
- **Symptômes :**
 - paupières rouges et gonflées
 - paupières collées
 - écoulement oculaire

Conjonctivite du Nouveau-Né (CNN)

- **Signes cliniques** :
 - écoulement oculaire souvent purulent
 - rougeur et tuméfaction des conjonctives
 - œdème et rougeur des paupières.
- **Etiologie** :
 - Neisseria gonorrhoeae
 - Chlamydia trachomatis
 - Autres germes
 - Staphylocoque aureus
 - Streptocoque pneumoniae
 - Haemophilus
 - Pseudomonas

Prurit pubien ou phtiriase du pubis

- **Signes cliniques**
 - prurit dans la région pubienne
 - présence des œufs de pou collés aux poils pubiens
- **Étiologie**
 - **phthirus pubis**