

# INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Par Dr Alex KALUME MD, MPH

# DEFINITION

CE SONT DES INFECTIONS QUI SE TRANSMETTENT PRINCIPALEMENT PAR UN RAPPORT SEXUEL ET AUSSI PAR UN CONTACT SEXUEL.

# QUELQUES IST COURANTES

- GONOCOCCIE - BLENNORRAGIE
- SYPHILIS
- CHANCRE MOU
- CHLAMIDIASE
- TRICHOMONIASE
- MALADIE DE NICOLAS FAVRE (LYMPHOGRANULOMATOSE VÉNÉRIEN)
- HÉPATITES B
- PHTISRIASIS (POUX DU PUBIS)
- GALE
- CANDIDOSE VÉNÉRIENNE
- HERPES GÉNITAL
- Infection à VIH
- Sida
- ETC.

# SIGNES DES IST

## CHEZ L'HOMME

Pus (écoulement purulent)  
Miction douloureuse  
Bubon inguinal  
Plaie  
Roséole  
Condylome  
Aucun signe

## CHEZ LA FEMME

Écoulement vaginal/leucorrhée :  
-Quantité augmentée  
-Odeur nauséabonde  
-Couleur jaunâtre  
Douleur/bas ventre  
Plaie  
Bubon inguinal  
Douleur en urinant  
Cartes géographiques au pli de l'aîne  
Condylome  
Roséole.

**QUELQUES SIGNES D'IST EN IMAGES**

# ÉCOULEMENT URÉTRAL :

**GOUTE DU PUS AU BOUT DU GLAND LE MATIN ;  
BRÛLURE À LA MICTION (CHAUDE PISSE)  
URINE EN ARROSOIR ET L'ÉCOULEMENT EST COLLANT ... >  
S'ACCOLE AU SLIP.**



# ÉCOULEMENT VAGINAL

ASYMPTOMATIQUE JUSQU'À 30 JOURS : DIFFICULTÉ POUR URINER PUIS INFLAMMATION DES ORGANES GÉNITAUX INTERNES

ÉCOULEMENT JAUNÂTRE





**BARTHOLINITE :**  
**DANS DES CAS RARES, L'ÉCOULEMENT VAGINAL VISIBLE PEUT**  
**DISPARAÎTRE ET LAISSER LA PLACE À LA BARTHOLINITE**  
**COMME SIGNE RÉVÉLATEUR.**

# ULCÉRATION GÉNITALE CHEZ L'HOMME OU LA FEMME



# ULCÉRATION GÉNITALE (CHANCRE MOU)



# ULCÉRATION GÉNITALE



# ULCÉRATIONS GÉNITALES



# DOULEUR TESTICULAIRE

CERTAINES IST PEUVENT CAUSER DES DOULEURS OU GONFLEMENTS AU NIVEAU DES TESTICULES. ILS S'ACCOMPAGNENT PARFOIS D'UN ÉCOULEMENT URÉTRAL ET DE DIFFICULTÉS POUR URINER. SOUVENT IL S'AGIT DES MÊMES MICROBES QUE CEUX QUI PROVOQUENT LES ÉCOULEMENTS URÉTRAUX.



**DOULEURS AU BAS VENTRE CHEZ LA FEMME.  
CETTE DOULEUR PEUT PROVENIR DE LA MATRICE, DES  
TROMPES OU DES OVAIRES EN CAS D'IST. ELLES  
PEUVENT S'ACCOMPAGNER DE DOULEURS PENDANT LES  
RAPPORTS SEXUELS, AU MOMENT D'URINER OU MÊME  
D'ÉCOULEMENT VAGINAL.**



**CAS D'UNE INFECTION AU NIVEAU DU  
COL DE L'UTÉRUS**

BUBON INGUINAL CHEZ L'HOMME OU CHEZ LA FEMME. ON VOIT LA PRÉSENCE D'UNE TUMÉFACTION À LA RÉGION GÉNITALE (PRÉCISÉMENT AU NIVEAU DE PLI DE L'AINE.



# MYCOSES, GALES, DÉMANGEAISONS



LES VÉGÉTATIONS ANO-GÉNITALES CHEZ L'HOMME ET LA FEMME  
: ENCORE APPELÉES CONDYLOMES



# CONDYLOME ACUMINÉ OU VÉGÉTATIONS ANO-GÉNITALES



# CONDYLOME




# GALES...



# BUBONS, TUMEFACTIONS



# CHANCRES SYPHILITIQUES



# CONJONCTIVITE DU NOUVEAU NÉ



# MORPION OU PHTIRIASIS



# HERPÈS GÉNITALE

## VÉSICULE, PRURIT, DOULEURS



# IST ASYMPTOMATIQUES

- CERTAINES IST NE MANIFESTENT AUCUN SIGNE PARTICULIER.
- C'EST AINSI QU'ON PARLE D'IST ASYMPTOMATIQUES.

# MODES DE TRANSMISSION

- RAPPORTS SEXUELS NON PROTEGES
- CONTACTS SEXUELS
- VOIE SANGUINE
- DE LA MERE INFECTEE A L'ENFANT

# FACTEURS FAVORISANT LA CONTAMINATION DES IST

- Quels sont les facteurs qui exposent les hommes (en uniforme) au risque de contracter une IST ?
- Quels sont les facteurs qui les rendent vulnérables aux IST ?

# FACTEURS DE RISQUE

## QUATRE TYPES DE FACTEURS

- Facteurs liés à la sexualité et aux modes de vie
- Facteurs liés à des actes médicaux
- Facteurs socio-économiques
- Facteurs biologiques

# A. FACTEURS LIÉS À LA SEXUALITÉ ET AUX MODES DE VIE

- La population jeune par son importance numérique, son ignorance, son inexpérience ;
- Les mouvements des populations (voyages, déplacements, migrations, etc....) ;
- La déscolarisation qui conduit à l'oisiveté ;
- La prostitution (occasionnelle ou régulière) ;
- La précocité des rapports sexuels ;
- La multiplicité des partenaires sexuels ;
- La drogue, l'alcool, etc.

## B. FACTEURS LIÉS À DES ACTES MÉDICAUX

- ⊙ Transfusions sanguines et ses dérivés ;
- ⊙ Tout acte chirurgical ;
- ⊙ Injections
- ⊙ Etc.

## C. FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

- La promiscuité ;
- La pauvreté ;
- Les pratiques traditionnelles (Lévirat, sororat, tatouage, utilisation collective des latrines à cuve, du nécessaire de soins intimes, etc.).

## D. FACTEURS BIOLOGIQUES

- L'immaturation des organes génitaux de la jeune femme ;
- La présence chez un individu des autres IST ;
- L'incirconcision chez les hommes.

# FACTEURS DE VULNERABILITE

- ⊙ Alcoolisme ;
- ⊙ Partenaires sexuels multiples ;
- ⊙ Taux élevé des IST ;
- ⊙ les déplacements permanents ;
- ⊙ Revenus bas spécialement chez les jeunes recrues ;
- ⊙ Abus d'autorité.

# COMPLICATIONS ET CONSEQUENCES DES IST

- ◉ QUELLES SONT LES COMPLICATIONS DES IST ?
- ◉ QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DES IST ?

# COMPLICATIONS DE LA BLENNORRAGIE = GONOCOCCIE = CHAUDE PISSE CHEZ L'HOMME(EU)

- ⊙ URÉTRITE
- ⊙ INFLAMMATION DE LA VÉSICULE SÉMINALE
- ⊙ PROSTATITE
- ⊙ CANCER DE PROSTATE
- ⊙ RÉTRÉCISSEMENT DE L'URÈTRE
- ⊙ STÉRILITÉ

# COMPLICATIONS DE LA BLENNORRAGIE = GONOCOCCIE = CHAUDE PISSE CHEZ LA FEMME(EV)

- ◉ Vaginite
- ◉ Cervicite
- ◉ infection utéro-annexielle
- ◉ Salpingite
- ◉ Ovarite
- ◉ Obstruction tubaire
- ◉ Stérilité

# COMPLICATIONS DE LA SYPHILIS

- ◉ CHRONICITÉ ...COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (FOLIE)
- ◉ ROSÉOLE...ATTAQUE DU SYSTÈME NERVEUX...MORT
- ◉ FEMME AVEC GROSSESSE...FOËTUS = MORT NÉ
  - =MALFORMATION
  - =FAIBLE POIDS
  - =PRÉMATURITÉ
- ◉ AVORTEMENT À RÉPÉTITION

# COMPLICATION DU CHANCRE MOU

- ◉ Très contagieuse
- ◉ Favorise le VIH

# COMPLICATION DE LA TRICHOMONIASES VAGINALES

- ⦿ Dyspareunie
- ⦿ Bartholinite

# COMPLICATIONS DE LA CHLAMIDIAE

- ⊙ BOUCHE LES TROMPES
- ⊙ COMPLICATIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL INTERNE DE LA FEMME CAR ASYMPTOMATIQUE
- ⊙ STÉRILITÉ
- ⊙ ADHÉRENCE PELVIENNE
- ⊙ RISQUE ÉLEVÉ DE G.E.U

# COMPLICATIONS DE LA CANDIDOSES

- ◎ CARTES  
GÉOGRAPHIQUES AUX  
PLIS DE L'AINE
- ◎ ODEUR DE POISSON  
SALÉ

# COMPLICATION DE L'HERPES GÉNITALE

- HERPES CONGENITALE CHEZ LE NOUVEAU NE

# CONSEQUENCES DES IST SUR LE PLAN SOCIAL ET ECONOMIQUE

- Méésentente
- Conflit
- Divorce
- Absentéisme
- Coûts financiers pour l'individu, la famille, la communauté

# MOYENS DE PREVENTION DES IST

- Comment prévenir la contamination des IST ?

# MOYENS DE PREVENTION DES IST

- ABSTINENCE
- BONNE FIDELITE
- CONDOM CORRECTEMENT ET SYSTEMIQUEMENT UTILISE
- REGLES D'HYGIENNE BIEN OBSERVEES

# REFLEXION

1. Est-il facile de pratiquer l'abstinence et la fidélité ?
2. Est-il aisé d'utiliser le préservatif ?
3. Motivez votre réponse

# PRINCIPES DE TRAITEMENT DES IST

- La majorité des infections sexuellement transmissibles sont curables.
- Une IST ne peut jamais guérir sans traitement.
- Une IST se contracte à deux ou a plusieurs et se soigne à deux ou à plusieurs.
- Le traitement adéquat des IST ne peut se faire que dans les structures de santé qualifiées (hôpital et centre de santé disposant d'un personnel qualifié - médecins, infirmiers).

# PRINCIPES DE TRAITEMENT DES IST

- Les autres professionnels de santé (laborantin, pharmacien, radiologue...) ont un rôle de guide, de conseil et d'orientation vers les structures ci-haut citées.
- Ils ne peuvent en rien se substituer au personnel qualifié soignant pour la prise en charge adéquate des IST.

# CONDUITE A TENIR EN CAS D'IST

- En cas de signes d'IST, quelle attitude adopter, quelle conduite tenir ?

# CONDUITE A TENIR EN CAS D'IST

- ◉ Aller le plus tôt au centre de santé ou à l'hôpital ;
- ◉ Toujours s'adresser aux personnes compétentes et qualifiées (médecins, infirmiers) pour prise en charge adéquate et à temps.
- ◉ Eviter l'automédication (le fait de se soigner soi-même).
- ◉ Respecter la posologie des médicaments (dose et durée de traitement) :

# CONDUITE A TENIR EN CAS D'IST

- Eviter les rapports sexuels pendant le traitement ou toujours utiliser une capote lors de tout rapport sexuel.
- Faire soigner son (sa) partenaire en même temps ;
- Eviter les conseils des personnes non qualifiées (amis, voisins...).

**QUESTIONS ?**

**MERCI DE  
VOTRE  
PARTICULIERE  
ATTENTION**